

# Aljabar Linier

[KOMS119602] - 2022/2023

## 4.2 - Eliminasi Gauss-Jordan

Dewi Sintiar

Program Studi S1 Ilmu Komputer  
Universitas Pendidikan Ganesha

Week 7-11 February 2022

Setelah pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat:

- menerapkan algoritma eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier.



Carl Friedrich Gauss  
(*German mathematician*)



Wilhelm Jordan  
(*German mathematician*)

Ini merupakan pengembangan dari metode Gaussian-Elimination.

- Operasi Baris Elementer (OBE) diimplementasikan pada matriks yang diperbesar, sehingga diperoleh *matriks eselon tereduksi*.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix} \sim ERO \sim \begin{bmatrix} 1 & * & * & \cdots & * & * \\ 0 & 1 & * & \cdots & * & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & * \end{bmatrix}$$

- Perbedaan dengan metode Gaussian adalah, disini **substitusi ke belakang tidak diperlukan** untuk mendapatkan nilai variabel.
- Nilai setiap variabel dapat diturunkan **langsung dari matriks yang diperbesar**.

# Langkah-langkah metode Gauss-Jordan

## 1 Fase maju (fase eliminasi Gauss)

Di bawah diagonal utama 1 harus 0.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 4 & 4 & -3 & 3 \\ -2 & 3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{ERO} \begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -1/2 & 5/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

## 2 Fase mundur

Di atas diagonal utama 1 harus 0.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -1/2 & 5/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} R1 - (3/2)R2 \\ \sim \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5/4 & -11/4 \\ 0 & 1 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} R1 + (5/4)R3 \\ R2 - (1/2)R3 \\ \sim \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Matriks terakhir adalah bentuk eselon baris tereduksi.

Kita dapat menurunkan solusinya secara langsung:  $x_1 = 1$ ,  $x_2 = 2$ ,  
 $x_3 = 3$ .

# Contoh 1

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -2 \\ -x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 \qquad \qquad - 3x_4 = -3 \end{cases}$$

Solusi:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & -4 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & -3 & -3 \end{bmatrix} \begin{array}{l} R2 - 2R1 \\ R4 - 3R1 \\ R3 + R1 \\ \sim \end{array} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -6 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R2/3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -6 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} R4 - 3R2 \\ R3 - R2 \\ \sim \end{array} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R1 + R2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Persamaan yang bersesuaian adalah:

$$x_1 - x_4 = -1$$

$$x_2 - 2x_3 = 0$$

## Contoh 1 (*lanjutan*)

Matriks augmentasi terakhir dalam bentuk eselon baris tereduksi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solusinya dapat diperoleh dengan menyelesaikan sistem:

$$x_1 - x_4 = -1$$

$$x_2 - 2x_3 = 0$$

Dari persamaan ke-2, kita peroleh:  $x_2 = 2x_3$

Dari persamaan pertama, kita peroleh:  $x_1 = x_4 - 1$

Misal  $x_3 = r$  dan  $x_4 = s$  dengan  $r, s \in \mathbb{R}$ .

Maka solusi sistemnya adalah:

$$x_1 = s - 1, \quad x_2 = 2r, \quad x_3 = r, \quad x_4 = s$$

Selesaikan sistem berikut menggunakan metode Gauss-Jordan

$$\begin{cases} -2x_3 + 7x_5 = 12 \\ 2x_1 + 4x_2 - 10x_3 + 6x_4 + 12x_5 = 28 \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 8x_4 - 5x_5 = -1 \end{cases}$$

**Solusi:**

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R1 \leftrightarrow R2} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R1/2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R3 - 2R1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix} \xrightarrow{R2/(-2)}$$



## Contoh 2 (lanjutan)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -7/2 & -6 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix} \begin{matrix} R3 - 5R2 \\ \sim \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -7/2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R3/(1/2) \\ \sim \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -7/2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} R1 - 6R3 \\ R2 + 7/2R3 \\ \sim \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} R1 + 5R2 \\ \sim \end{matrix}$$

Dari matriks augmentasi terakhir, dapat diturunkan:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 7 \\ x_3 = 1 \\ x_5 = 2 \end{cases}$$

Misal  $x_2 = s$  dan  $x_4 = t$ , solusi SPL tersebut adalah:

$$x_1 = 7 - 2s - 3t, \quad x_2 = s, \quad x_3 = 1, \quad x_4 = t, \quad x_5 = 2, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

## Contoh 3

Selesaikanlah sistem berikut menggunakan metode Gauss-Jordan.

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Matriks augmentasinya adalah:

$$\left[ \begin{array}{cccccc} 2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

yang dapat direduksi menjadi bentuk eselon baris:

$$\left[ \begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

## Contoh 3 (*lanjutan*)

Sistem persamaan linier yang sesuai adalah:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 & + x_5 = 0 \\ & x_3 + x_5 = 0 \\ & & x_4 = 0 \end{cases}$$

Dengan menyelesaikan *variabel utama*, diperoleh:

$$x_1 = -x_2 - x_5$$

$$x_3 = -x_5$$

$$x_4 = 0$$

Solusi umumnya adalah:

$$x_1 = -s - t, \quad x_2 = s, \quad x_3 = -t, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = t, \quad \text{with } s, t \in \mathbb{R}$$

Apa yang dapat kamu amati dari SPL di atas?

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 & + x_5 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 & - x_5 = 0 \\ & x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

# Sistem Persamaan Linier Homogen

Ingatlah bahwa sistem berikut ini disebut **SPL homogen**.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0$$

.....

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0$$

SPL tersebut selalu memiliki solusi, yakni:

$$x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$$

yang dinamakan solusi trivial

Jika solusi selain  $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$  ada, maka itu disebut **solusi tidak trivial**.

## Example

Dari Contoh 3 bagian sebelumnya, kita memperoleh solusi dari SPL yang diberikan adalah:

$$x_1 = -s - t, \quad x_2 = s, \quad x_3 = -t, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = t, \quad \text{with } s, t \in \mathbb{R}$$

Dalam hal ini, jika  $s, t = 0$ , maka kita mendapatkan **solusi trivial**, yaitu:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = 0$$

Kita dapat mengatur  $s \neq 0$  atau  $t \neq 0$  untuk mendapatkan **solusi tak-trivial**.

# Contoh: Penyelesaian SPL dengan Eliminasi Gauss-Jordan

Selesaikan SPL homogen berikut dengan eliminasi Gauss-Jordan:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

**Solusi:**

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & -2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R1 \leftrightarrow R2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & -2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R3 - 2R1 \\ R4 + 2R1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -8 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R2/2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -8 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R3 - 3R2 \\ R4 - R2 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R1 + 3R3 \\ R2 - 2R3 \\ R4 + 10R3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



*Kapankah sebuah sistem linier homogen memiliki tak-hingga banyaknya solusi?*

*Kapankah sebuah sistem linier homogen memiliki tak-hingga banyaknya solusi?*

*Berapa banyak variabel bebas yang ada dalam sistem linier homogen (hubungkan dengan nilai  $n$  dan  $r$ )?*

## Teorema

*Jika sistem linier homogen memiliki  $n$  yang tidak diketahui, dan jika bentuk eselon baris tereduksi dari matriks augmented-nya memiliki  $r$  baris bukan nol, maka sistem tersebut memiliki variabel bebas sebanyak  $n - r$ .*

## Teorema

*Sistem linier homogen dengan lebih banyak variabel daripada persamaan memiliki tak-hingga banyaknya solusi.*

*bersambung...*